

**Aufgabe 1**

Sei  $\tau := \{P, Q, <\}$  mit zwei einstelligigen Relationssymbolen  $P$  und  $Q$  sowie einem zwistelligen Relationssymbol  $<$ . Wandeln Sie folgende Formel zuerst in Negationsnormalform, dann weiter in Pränex-Normalform und schließlich in Skolem-Normalform um.

$$\varphi := \quad Py \wedge \exists x(Qx \rightarrow \neg \exists z(x \neq z)) \wedge \neg \exists y \forall z(y < z \vee y = z) \quad \in \text{FO}(\tau)$$

**Aufgabe 2**

Sei  $f$  ein einstelliges Funktionssymbol,  $S$  und  $T$  einstellige Relationssymbole sowie  $E, R$  und  $<$  zweistellige Relationssymbole. Geben Sie ein, wenn möglich endliches, Axiomensystem für die folgenden Klassen von Strukturen an.

(a)  $\mathcal{K}_a := \{(A, R, S, T) \mid R \text{ ist Graph einer Bijektion zwischen } S \text{ und } T\}$

(b)  $\mathcal{K}_b :=$

$$\{(V, E) \mid G = (V, E) \text{ ist ein ungerichteter Graph mit beliebig großen endlichen Cliques}\}$$

*Hinweis:* Eine *Clique* in einem ungerichteten Graphen ist eine Menge von Knoten, die alle paarweise miteinander durch direkte Kanten verbunden sind.

(c) (Falls noch Zeit ist:)

$\mathcal{K}_c :=$

$$\{(A, f, <) \mid < \text{ ist eine diskrete lineare Ordnung und } f \text{ ist monoton bzgl. } < \}$$

*Hinweis:* In einer *diskreten* linearen Ordnung hat jedes Element einen direkten Vorgänger und Nachfolger (minimale und maximale Elemente sind davon ausgenommen).

Eine Funktion  $f: A \rightarrow A$  ist *monoton* bzgl.  $<$  wenn für alle  $a, b \in A$  aus  $a \leq b$  auch  $f(a) \leq f(b)$  folgt.