

## 5. Übung Mathematische Logik II

Abgabe: bis Montag, 24. November um 12:00 Uhr am Lehrstuhl.

### Aufgabe 1

2 + 4 Punkte

Zeigen oder widerlegen Sie:

- (a)  $|\{\alpha < \aleph_1 \mid \alpha \text{ ist Nachfolgerordinal}\}| = \omega$ ,
- (b)  $|\{\alpha < \aleph_1 \mid \alpha \text{ ist Limesordinal}\}| = \omega$ .

### Aufgabe 2

3 + 3 Punkte

Eine Menge  $x$  ist Dedekind-endlich, wenn keine echte Teilmenge von  $x$  gleichmächtig zu  $x$  ist. Zeigen Sie:

- (a) Die Menge  $x$  ist genau dann Dedekind-endlich, wenn sie endlich ist.
- (b) Die Menge  $x$  ist genau dann endlich, wenn jede Funktion  $f : x \rightarrow x$ , die injektiv oder surjektiv ist, bereits bijektiv ist.

### Aufgabe 3\*

4\* Punkte

Es sei  $x$  eine Menge mit  $|x| \leq \kappa$  für ein  $\kappa \in \text{Cn}^\infty$  und es gelte  $|y| \leq \kappa$  für alle  $y \in x$ . Zeigen Sie, dass  $|\bigcup x| \leq \kappa$  ist.

### Aufgabe 4

5\* + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 5\* Punkte

Sei  $A$  eine Menge und sei  $\leq$  eine lineare Ordnung auf  $A$ . Eine Teilmenge  $X$  von  $A$  heißt *kofinal* in  $A$ , wenn für jedes  $a \in A$  ein  $x \in X$  existiert, so dass  $a \leq x$  gilt. Sei  $\alpha$  eine Ordinalzahl. Die Kofinalität  $\text{cf}(\alpha)$  von  $\alpha$  ist die kleinste Ordinalzahl, so dass eine Abbildung  $f : \text{cf}(\alpha) \rightarrow \alpha$  existiert, deren Bild in  $\alpha$  nicht beschränkt ist. (Das heißt für alle  $\gamma \in \alpha$  gibt es ein  $\delta \in \text{cf}(\alpha)$ , so dass  $f(\delta) \geq \gamma$  ist.) Eine Ordinalzahl  $\alpha$  heißt regulär, falls  $\alpha$  Limesordinalzahl ist und  $\text{cf}(\alpha) = \alpha$  gilt.

- (a\*) Zeigen Sie, dass jede lineare Ordnung  $(A, \leq)$  eine kofinale wohlgeordnete Teilmenge besitzt.
- (b) Berechnen Sie  $\text{cf}(\alpha)$  für  $\alpha = \omega$ ,  $\alpha = \omega \cdot 2$  und für jede Nachfolgerordinalzahl  $\alpha$ .
- (c) Zeigen Sie, dass  $\text{cf}(\alpha)$  für Limesordinals  $\alpha$  selbst wieder ein Limesordinal ist.
- (d) Zeigen Sie, dass es für jedes  $\alpha \in \text{On}$  eine streng monoton wachsende Funktion  $f : \text{cf}(\alpha) \rightarrow \alpha$  gibt, die in  $\alpha$  unbeschränkt ist.
- (e) Zeigen Sie, dass  $\text{cf}(\text{cf}(\alpha)) = \text{cf}(\alpha)$  gilt für alle  $\alpha \in \text{On}$ .
- (f) Zeigen Sie, dass  $\text{cf}(\alpha) \in \text{Cn}$  für alle  $\alpha \in \text{On}$  gilt.
- (g) Zeigen Sie, dass  $\text{cf}(\aleph_\omega) = \omega$  gilt.
- (h\*) Zeigen Sie, dass alle Nachfolgerkardinalzahlen regulär sind.